

1. En enatomig idealgas befinner sig vid temperaturen 200 K och upptar volymen 2 kubikmeter. Gasen genomgår en kretsprocess bestående av följande delprocesser:

- o Isoterm kompression till halva ursprungsvolymen.
- o Isokor ökning av trycket med 25%.
- o Isobar expansion.

Bestäm processens termiska verkningsgrad.

Lösning:

enatomig gas: $\zeta_V = \frac{5}{2}R$, $\zeta_P = \frac{7}{2}R$, $\gamma = \frac{5}{3}$

$$\eta = \frac{\sum W}{\sum Q_{HUF}} = \frac{\sum Q}{\sum Q_{HUF}} = \frac{Q_{12} - Q_{23} + Q_{34}}{Q_{23} + Q_{34}}$$

Bestäm samtliga Q_{in} :

1 $\rightarrow$ 2: isoterm: $Q_{12} = W_{12} = n'RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = n'R \cdot 200 \cdot \ln \frac{1}{2} = -n'R \cdot 138,6 < 0$

$V_2 = \frac{1}{2}V_1$

2 $\rightarrow$ 3: isokor: $Q_{23} = n'\zeta_V(T_3 - T_2) = n' \cdot \frac{5}{2}R(250 - 200) = +n'R \cdot 75$

$P_3 = 1,25P_2 \Rightarrow T_3 = 1,25T_2 = 250 K$

$V_3 = V_2 = 200 K$

3 $\rightarrow$ 4: isobar: $Q_{34} = n'\zeta_P(T_4 - T_3) = n' \cdot \frac{7}{2}R(T_4 - T_3)$

Bestäm T_4 : adiabat: $PV^\gamma = \text{konstant}$

idealgaslagen: $PV = n'RT \Rightarrow P = n'RT/V$

$\Rightarrow T_4 V_4^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1}$

desutom: $P_3 V_3 = n'RT_3 \Rightarrow \frac{V_3}{V_4} = \frac{T_3}{T_4}$

$P_3 \Rightarrow P_4 V_4 = n'RT_4 \Rightarrow V_4 = V_3 \frac{T_3}{T_4}$

$\Rightarrow T_4 V_3^{\gamma-1} \left(\frac{T_3}{T_4}\right)^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1} \Rightarrow T_4^\gamma = T_3^\gamma \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^\gamma \Rightarrow T_4 = T_3 \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma/5}$

$T_4^\gamma = 250^\gamma \left(\frac{2}{200}\right)^{\gamma/5} \Rightarrow T_4 = \left[250^{2/3} \cdot (2)^{2/3} \cdot 200\right]^{3/5} = 288 K$

$\Rightarrow Q_{34} = n'R \cdot \frac{7}{2}(288 - 250) = n'R \cdot 95$

$\eta = \frac{-138,6 + 75 + 95}{75 + 95} = 0,185$

2. En kretsprocess består av följande delprocesser:
- 1-2: isokor uppvärmning från $p_1 = 1,0 \text{ atm}$, $T_1 = 300 \text{ K}$ till $p_2 = 15,0 \text{ atm}$
 - 2-3: adiabatisk expansion till $p_3 = 1,0 \text{ atm}$
 - 3-1: isobar avkylning
- Bestäm verkningsgraden om gasen är enatomig med idealt uppförande.

Lösning:

enatomig gas: $\zeta_V = \frac{5}{2}R$, $\zeta_P = \frac{7}{2}R$, $\gamma = \frac{5}{3}$

$$\eta = \frac{\sum W}{\sum Q_{HUF}} = \frac{Q_{12} + Q_{31}}{Q_{12}}$$

1 $\rightarrow$ 2: isokor: $Q_{12} = n' \cdot \frac{5}{2}R \cdot (T_2 - T_1)$

$T_1 = 300 K$, $V_2 = V_1$, $p_2 = 15p_1 \Rightarrow T_2 = 15T_1 = 4500 K$

$\Rightarrow Q_{12} = n'R \cdot \frac{5}{2}(4500 - 300) = n'R \cdot 6300$

3 $\rightarrow$ 1: isobar: $Q_{12} = n' \cdot \frac{5}{2}R(T_1 - T_3)$

Bestäm T_3 : adiabat: $PV^\gamma = \text{konstant}$

$PV = n'RT \Rightarrow V = n'RT/P$

$\Rightarrow P \left(\frac{T}{P}\right)^\gamma = \text{konstant} \Rightarrow P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{konstant}$


$\Rightarrow T_3 \cdot P_3^{1-\gamma} = T_2 \cdot P_2^{1-\gamma}$

$\Rightarrow T_3 = \left(\frac{P_2}{P_3}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \cdot T_2 = \left(\frac{15p_1}{p_1}\right)^{-\frac{2}{5}} \cdot 4500 = 15^{-2/5} \cdot 4500 = 1523 K$

$\Rightarrow Q_{12} = n'R \cdot \frac{5}{2}(300 - 1523) = n'R(-3057,5)$

$\eta = \frac{6300 - 3057,5}{6300} = 0,51$

3. 1,00 kg kvävgas genomlöper en Carnotprocess varvid den högsta temperaturen är 160 grader Celsius. Verkningsgraden är 35% och den tillförda värmemängden är 0,1 MJ. Beräkna förhållandet mellan den största och den minsta volymen under processen. I det aktuella temperaturintervallet kan kvävgasen betraktas som en ideal gas med fem frihetsgrader.



$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \Rightarrow T_2 = T_1(1 - \eta) = 433(1 - 0,35) = 281,4 \text{ K}$$

Q_1 ger samband mellan V_1 och V_2

$TV^{\gamma-1}$ ger samband mellan V_2 och V_3

$$Q_1 = n'R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow V_2 = V_1 \cdot e^{\frac{Q_1}{n'R T_1}}$$


$$T_2 V_3^{\gamma-1} = T_1 V_2^{\gamma-1} \Rightarrow V_3 = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{1/\gamma-1} V_2$$

$$\Rightarrow V_3 = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{1/\gamma-1} V_1 \cdot e^{\frac{Q_1}{n'R T_1}}$$

$$\Rightarrow \frac{V_3}{V_1} = \left(\frac{433}{281,4}\right)^{1/5} \cdot e^{\left(\frac{0,1 \cdot 10^6}{0,028 \cdot 8,31 \cdot 433}\right)} =$$

$$= \underline{\underline{6,4}}$$

4. En mol enatomig idealgas genomlöper en kretsprocess som består av följande steg: en isokor där volymen tredubblas följt av en isobar där volymen tredubblas följt av en isokor där volymen reduceras till en tredjedel följt av en isobar tillbaka till utgångstillståndet. Beräkna processens termiska verkningsgrad.



$$ZW = 3P_0(3V_0 - V_0) + P_0(V_0 - 3V_0) =$$

$$= 9P_0V_0 - 3P_0V_0 + P_0V_0 - 3P_0V_0 = 4P_0V_0 = 4n'R T_1$$

$$T_2 = 3T_1, T_3 = 3T_2 = 9T_1, T_4 = \frac{1}{3}T_3 = 3T_1$$

$$Q_{12} = n' C_V (T_2 - T_1) = n' \frac{3}{2} R (3T_1 - T_1) = n' R 3T_1$$

$$Q_{23} = n' C_P (T_3 - T_2) = n' \frac{5}{2} R (9T_1 - 3T_1) = n' R 15T_1$$

$$\therefore \eta = \frac{4T_1}{3T_1 + 15T_1} = \frac{4}{18} = \underline{\underline{0,22}}$$

u. 1,0 kg syrgas genomlöper en kretsprocess som består av följande delprocesser:

1-2: isoterm expansion vid temperaturen 493 K mellan volymerna 1,0 och 4,0 kubikmeter.


2-3: isokor

3-4: isoterm kompression vid temperaturen 293 K.

4-1: adiabat.

Beräkna tryck och volym i delprocessernas ändpunkter och bestäm dessutom verkningsgraden.

Lösning:



$$\eta = \frac{W}{Q_{in}}$$

1 → 2: isobar
2 → 3: isokor
3 → 1: isoterm

$$1 \rightarrow 2: W_{12} = P_1(V_2 - V_1)$$

$$Q_{12} = n' C_p (T_2 - T_1)$$

$$2 \rightarrow 3: Q_{23} = n' C_v (T_3 - T_2)$$

$$3 \rightarrow 1: Q_{31} = W_{31} = n' R T_1 \ln \frac{V_1}{V_3}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{P_1(V_2 - V_1) + n' R T_1 \ln \frac{V_1}{V_3}}{n' C_p (T_2 - T_1)}$$

uttryck allt i T_1 och T_2 !

$$P_1 V_1 = n' R T_1 \Rightarrow P_1(V_2 - V_1) = n' R (T_2 - T_1)$$

$$P_1 V_1 = n' R T_1$$

$$P_2 V_2 = P_1 V_3 = n' R T_2 \Rightarrow \frac{V_1}{V_3} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{(T_2 - T_1) + T_1 \ln \frac{T_1}{T_2}}{\frac{5}{2} (T_2 - T_1)}$$

$$= \frac{(1,47 - 1) + \ln 1/1,47}{\frac{5}{2} (1,47 - 1)} = 0,072$$

(k)	(m ³)	(10 ⁵ N/m ²)
T	V	P
1	4,93	1,128
2	4,93	0,132
3	2,93	0,19
4	2,93	0,06

$$O_2: 32 \text{ kg/mol} \quad m_{mol} = 0,032 \text{ kg}$$

$$\chi = \frac{7}{5}$$

$$n' = \frac{1000}{32}$$

$$P_1 = \frac{n'}{V_1} R T_1 = \frac{1000}{32 \cdot 4,0} \cdot 8,31 \cdot 493 = 1,128 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$V_2 = 4 V_1 \quad T_2 = T_1 \Rightarrow P_2 = \frac{1}{4} P_1 = 0,132 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$T_3 = 293 \text{ K} \quad V_3 = V_2 \Rightarrow P_3 = P_2 \frac{T_3}{T_2} = 0,19 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$P_4 V_4 = P_1 V_1^{\gamma} \Rightarrow V_4^{\gamma} = \frac{P_1 V_1^{\gamma}}{P_4}$$

$$P_1 V_1 = P_3 V_3 \Rightarrow V_4 = \frac{P_1 V_1}{P_3 V_3}$$

$$\Rightarrow V_4^{\frac{7}{5}-1} = \frac{1,128 \cdot 10^5}{0,19 \cdot 4,0} \Rightarrow V_4 = 3,08 \text{ m}^3$$

$$\Rightarrow P_4 = n' \frac{R T_4}{V_4} = 0,2065 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$\eta = \frac{Q_{12} + Q_{23} + Q_{34}}{Q_{12}}$$

$$Q_{12} = n' R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$Q_{23} = n' C_v (T_3 - T_2)$$

$$Q_{34} = n' R T_3 \ln \frac{V_4}{V_3}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{493 \cdot \ln 4 + \frac{5}{2} (293 - 493) + 293 \cdot \ln \frac{3,08}{4}}{493 \cdot \ln 4}$$

$$= \frac{683,44 - 500 - 24,4}{683,44} = 0,23$$

7. 25 liter av en enatomig idealgas befinner sig ursprungligen vid temperaturen 350 grader Celsius och trycket 4,0 atm. Gasen får expandera isotermt till dubbla volymen. Därpå komprimeras gasen till volymen V_3 som är så vald att man genom adiabatisk kompression kan återföra den till det ursprungliga tillståndet. Hur mycket värme tillförs under isotermin? Hur mycket arbete utträttas under adiabaten? Hur stor är verkningsgraden?

Lösning:


Enatomig gas $\gamma = \frac{5}{2}$ $C_p = \frac{5}{2} R$ $\gamma = \frac{5}{3}$ $\frac{1-\gamma}{\gamma} = -\frac{2}{5}$

Givet: $V_1 = 25 \text{ liter}$ $V_2 = 50 \text{ liter}$

$T_1 = 623 \text{ K}$

$P_1 = 4,0 \text{ atm}$

Sök: Q_{12}, W_{31}, η



$Q_{12} = nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$

$n = \frac{P_1 V_1}{RT_1} = \frac{4,0 \cdot 1013 \cdot 10^5}{8,314 \cdot 623} = 7,77$

$Q_{12} = 7,77 \cdot 8,314 \cdot 623 \cdot \ln 2 = 10,0 \text{ kJ}$

$W_{31} = -\Delta U_{31} = -n C_v (T_1 - T_3) = n C_v (T_3 - T_1) < 0$

Bestäm T_3 : $3 \rightarrow 1$ adiabat $\Rightarrow T_3 P_3^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_1 P_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$

$\Rightarrow T_3 = T_1 \left(\frac{P_1}{P_3} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$ $T_1 = T_3$ $P_3 = P_1$ $V_3 = V_1$ $\Rightarrow P_3 = \frac{P_1}{2}$

$W_{31} = n C_v (T_3 - T_1) = \frac{5}{2} n R (423 - 623) = -5,17 \text{ kJ}$

$\eta = \frac{Q_{12} + Q_{31}}{Q_{12}} = \frac{10,0 - 5,17}{10,0} = 0,483$

$\Rightarrow \eta = 48,3\%$

8. En idealgasmotor arbetar med två mol av en enatomig gas och karakteriseras av arbetscykelns tre steg:

1-2: isobar från utgångsvolym V_1 och utgångstemperatur $T_1 = 300 \text{ K}$ till temperaturen $T_2 = 800 \text{ K}$.

2-3: adiabat tills temperaturen fallit tillbaka till T_1 .

3-1: isoterm till den ursprungliga volymen V_1 .


Hur mycket arbete utför gasen under adiabaten, hur mycket värme tillförs under isobaren, hur stor är verkningsgraden?

$n = 2,0$

Givet: $T_1 = 300 \text{ K}$ $T_2 = 800 \text{ K}$

1 $\rightarrow$ 2 isobar, 2 $\rightarrow$ 3 adiabat, 3 $\rightarrow$ 1 isoterm

Sök: W_{23}, Q_{12}, η



$W_{23} = -\Delta U_{23} = -n C_v (T_3 - T_2) = -2,0 \cdot \frac{5}{2} R (300 - 800) = 12,465 \text{ J} = 1,2 \cdot 10^3 \text{ J}$

$Q_{12} = n C_p (T_2 - T_1) = 2,0 \cdot \frac{5}{2} R (800 - 300) = 20,775 \text{ J} = 2,1 \cdot 10^3 \text{ J}$

$\eta = \frac{Q_{12} + Q_{31}}{Q_{12}}$

$Q_{31} = n R T_1 \ln \frac{V_1}{V_3}$

men $T_2 V_2^{\gamma-1} = T_1 V_3^{\gamma-1}$

derivera

$\frac{V_2}{T_2} = \frac{V_1}{T_1} \Rightarrow V_3 = V_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$

$\Rightarrow \frac{V_1}{V_3} = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$

$\Rightarrow Q_{31} = 2,0 \cdot 8,314 \cdot 300 \cdot \ln \left(\frac{300}{800} \right)^{\frac{5}{2}} = -12,226 \text{ J}$

$\eta = \frac{20,775 - 12,226}{20,775} = 0,41$